

## PREGUNTAS

1.- El mayor riesgo de sufrir Hipertrofia Ventricular Izquierda lo tienen:

- a) Hombres diabéticos normotensos
- b) Hombres diabéticos hipertensos
- c) Mujeres diabéticas normotensas
- d) Mujeres diabéticas hipertensas
- e) Ninguno de los anteriores

2.- En pacientes diabéticos asintomáticos, la afección cardiaca más frecuente es:

- a) Hipertrofia de Ventrículo Izquierdo
- b) Hipertrofia Cardiaca Global
- c) Disfunción Sistólica del Ventrículo Izquierdo
- d) Disfunción Diastólica del Ventrículo Izquierdo
- e) Ninguna de las anteriores

3.- Sobre el Acido Úrico y la Hipertensión Arterial se afirma que:

- a) No se ha encontrado relación entre esas patologías.
- b) No existen modelos animales para estudiar tal efecto
- c) La Hiperuricemia predice el apareamiento de Pre Hipertensión pero no de HTA
- d) La Hiperuricemia persistente predice el desarrollo de HTA
- e) Ninguna de las anteriores

**4.- En pacientes hipertensos mayores de 70 años se afirma que en su mayoría adolecen del siguiente tipo de HTA:**

- a) Hipertensión sistólo – diastólica**
- b) Hipertensión diastólica aislada**
- c) Hipertensión Sistólica aislada**
- d) Todas las anteriores**
- e) Ninguna de las anteriores**

**5.- La familia de Anti-hipertensivos a los que NO se les ha demostrado efecto protector vascular son:**

- a) Bloqueadores Receptor Angiotensina y Beta Bloqueadores**
- b) iECA y Calcio Antagonista**
- c) Alfa-Bloqueadores y Diuréticos**
- d) Calcio Antagonista y Beta - Bloqueadores**
- e) iECA y Beta - Bloqueadores**